

## Огнестрельные раны

1. Вывести из шока - искусств. дыхание и массаж сердца.
2. Адреналин - 0,5 - 1 мл подкож.
3. Атропин - 0,5 - 1 мл подкож.
4. Кордиамин - 1 - 2 мл подкож. (можно в 1 шприц)
5. При сильном кровотечении - наложить жгут или пережать пальцем сосуд.
6. Анальгин - 1 - 2 мл в/мыш.
7. Димедрол - 1 - 4 мл в/мыш.
8. Викасол - 1 - 2 мл в/мыш. (можно в 1 шприц)
9. Выстричь шерсть, наложить бинты (при необходимости - шину).
10. При большой кровопотере - выпить регидроном (1 - 3 стакана).

## Кусаные и резаные раны

1. Остановить кровотечение (наложить жгут или пережать пальцем сосуд).
2. Обработать перекисью (при слабом, но продолжительном кровотечении - приложить ватку, смоченную адреналином).
3. Анальгин - 1 - 2 мл в/мыш.
4. Димедрол - 1 - 4 мл в/мыш.
5. Викасол - 1 - 2 мл в/мыш. (можно в 1 шприц)
6. Выстричь шерсть, промыть марганцовкой, наложить бактериальную мазь или присыпку "цамакс".

## Отравление

Симптомы - слабость, дрожь, сильное слюнотечение, рвота, судороги мышц, учащённое поверхностное дыхание, болезненный живот, возбудимость или, наоборот, угнетённость и др.

1. Вызвать рвоту - палец глубоко в рот на корень языка (или туда же 0,5 ч/л соли).  
Подручные рвотные средства:  
- 2 ч/л соли на стакан тёплой воды, вливать в рот спринцовкой;  
- горчица - 1 ст/л на стакан тёплой воды;  
- перекись водорода с водой 1:1, вливается в рот из расчёта 1 ст/л на 3 кг веса;
2. Заливать слабо-розовый р-р марганцовки (из бутылки, пакета), вызывая рвоту неск. раз (не менее 3 л марганцовки).
3. Дать 5 - 10 табл. активир. угля или полисорб, можно смешать с вазелин. маслом. Вместо угля можно использовать яичный белок. После этого рвоту не вызывать!
4. Сделать клизму с марганцовкой или подсоленной водой (1 ч/л на стакан), немного тёплой, 0,1 - 1,5 литра. Можно добавить в клизму полисорб.
5. Атропин - 2 - 4 мл подкож.
6. Кордиамин - 0,5 - 1 мл подкож.
7. Выпаивать р-ром регидрона 1 - 3 стакана каждый час в течение 2 - 3 часов. Дать баксин - 10 мг на кг веса.
8. При отравлении синтетич. и пищевыми ядами ввести подкож., в/венно или в/мыш. гамавит (аминовит GM) - 5 мл на 1 кг веса.

# ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ СОБАКЕ

в экстренной ситуации  
до прихода врача

## Аптечка первой помощи

1. Бинты, вата, жгут, лейкопластырь, шприцы
2. Анальгин - 10 таблеток, ампулы
3. Борная к-та, порошок (20г)
4. Зелёнка, йод
5. Викасол, ампулы (4 шт)
6. Гентамицин 4% (флакон) -
7. Сода питьевая (30г)
8. Димедрол - ампулы (4 шт), таблетки (6 шт)
9. Марганцовка
10. Кальция глюконат, ампулы (4 шт)
11. Кордиамин, ампулы (2 шт)
12. Масло вазелиновое, касторовое
13. Новокаин, ампулы (2%)
14. Адреналин, ампулы (2 шт) (преднизолон)
15. Регидрон - таблетки, порошок
16. Но-шпа, ампулы (4 шт), таблетки (10 шт)
17. Перекись водорода (3%)
18. Активир. уголь (полисорб) - 20 таб.
19. Физ. р-р (0,9%)
20. Атропин, ампулы - 2 шт.

## Перелом

1. Надеть намордник.
  2. Анальгин - 1 - 2 мл в/мыш.
  3. Димедрол - 1 - 4 мл в/мыш. (Можно в 1 шприц).
- При закрытых переломах можно таблетки: анальгин и димедрол - по 1-3 табл. одновременно и дать запить тёплой водой.
4. При открытых переломах - остановить кровотечение (жгутом) через 15 - 20 мин после обезболивания (если нельзя раньше).
  5. Выстричь шерсть, промыть р-ром марганцовки и обработать перекисью рану.
  6. На рану (открытый перелом) наложить повязку из 8 слоёв марли (льняное полотно).
  7. Наложить шину из подручного материала (прутья, линейка, проволока).

## Поражение газовым баллончиком

1. Голову собаки поместить под проточную воду на 10 - 15 мин до полного удаления отравляющего в-ва на шерсти.
2. Атропин - 1 - 2 мл подкож.
3. Кордиамин - 0,5 - 2 мл подкож.
4. Димедрол - 1 - 4 мл в/мыш.
5. Выпить раствором регидрона 1 - 3 стак.

## Кровотечение из крупных сосудов

1. Надеть намордник.
2. Наложить жгут (либо пережать пальцем сосуд, если рана в области головы, туловища).
3. Наложить давящую повязку (один стерильный бинт валиком кладут на рану, другим прибинтовывают).
4. Адреналин - 0,5 - 1 мл подкож.
5. Кордиамин - 1 - 2 мл подкож.
6. Викасол - 1 - 2 мл в/мыш.
7. Выпить раствором регидрона 1 - 10 стак.
8. Через 2 часа снять повязку (при возникновении кровотечения - наложить вновь).

## Удар машиной

1. Надеть намордник, уложить собаку на здоровый бок, очистить рот от слизи.
2. При шоковом состоянии - см. ШОК.
3. Остановить кровотечение (жгут, бинт).
4. Анальгин - 1 - 2 мл в/мыш.
5. Димедрол - 1 - 4 мл в/мыш.
6. Викасол - 1 - 2 мл подкож., 1 - 2 мл в/м.
7. Выстричь шерсть, промыть св.-розовым раствором марганцовки или перекисью.
8. При переломах - шины или фиксир. бинты.
9. Каждые 2 часа измерять  $t^{\circ}$ , при падении ( $38^{\circ}$ - $37,5^{\circ}$ - $37^{\circ}$ ) - снова ввести кордиамин.
10. Пить раствором регидрона, везти на рентген.

## Остановка дыхания и сердца

1. Положив собаку на бок, провести искусственное дыхание (долго, до установления самостоятельного дыхания) сдавливанием грудной клетки или "рот в нос" 10-20 раз в мин.
2. Если сердце не бьётся - массаж сердца (сильно, энергично 100 раз в мин.)
3. Делать 15 сек - массаж сердца, 10 сек - искусств. дыхание ротом в нос, до появления пульса и дыхания.
4. Адреналин - 0,5-1 мл подкож.
5. Атропин - 0,5 - 1 мл подкож.
6. Кордиамин - 1 - 2 мл подкож.  
(можно в одном шприце)

## Шок

(угнетение всех жизн. функций, замедл дыхание, неровное сердцебиение, бледные дёсны, слабость или потеря сознания,  $t^{\circ}$  менее  $37^{\circ}\text{C}$ )

1. Положить собаку, приподняв зад. часть.
2. Если нужно - сделать искусств. дыхание и массаж сердца.
3. Адреналин - 0,5 - 1 мл подкож.
4. Атропин - 0,5 - 1 мл подкож.
5. Кордиамин - 1 - 2 мл подкож.  
(можно в 1 шприце)
6. Завернуть в тепло, не давать еды, воды, не разрешать ходить.  
Если большие травмы -
7. Анальгин - 1 - 2 мл в/мыш.
8. Димедрол - 1 - 4 мл в/мыш.  
(можно в 1 шприце)

## Укусы змей

(возбуждение, дрожь, рвота, упадок сил, сильное слюноотделение, частый пульс)

1. Зафиксировать собаку лёжа; при укусе в лапу - наложить давящ. повязку выше укуса.
2. Выдавить (отсосать) максимум яда (10 мин).
3. Обработать св.-малин. р-ром марганцовки, ввести новокаин выше укуса либо приложить холод, туго забинтовать через слой ваты.
4. Адреналин - 0,5 - 1 мл подкож.
5. Атропин - 0,5 - 1 мл подкож.  
(можно в 1 шприце)  
(Либо ввести преднизолон и сульфакамфокаин)
6. Обильно пить раствором регидрона (крепким чаем, кофе, водкой).
7. При отёках - вводить тавегил (супрастин, димедрол) 2 раза в день.

## Утопление

1. Освободить горло, рот, желудок от воды, перевернув собаку головой вниз и сдавливая ритмично грудь и брюшину.
2. Очистить рот от слизи платком (марлей).
3. Вывести язык набок, зафиксировать и сделать искусств. дыхание и массаж сердца.
4. Адреналин - 0,5 - 1 мл подкож.
5. Атропин - 0,5 - 1 мл подкож.
6. Кордиамин - 1 - 2 мл подкож.  
(можно в 1 шприце)
7. Жёстко растереть полотенцем, укутать.

## Солнечный или тепловой удар

Симптомы - слабость, угнетение, учащённое дыхание, иногда - судороги, рвота, носовое кровотечение, потеря сознания.

1. Завести собаку в прохладное место.
2. Ослабить ошейник, снять намордник.
3. Выпить холодной водой.
4. Обернуть мокрой простыней или поставить в воду (поливать из душа).
5. Холодный компресс на голову.
6. Кордиамин - 1 - 2 мл подкож.

## Острая аллергическая реакция

Симптомы - сыпь, слёзы, зуд, покраснение кожи (смотри внутри ушей), иногда - распухание морды и отёки.

1. Прекратить действие аллергена (лекарства, травы, духов, бензина, газа и т.д.).
2. Если нет пульса и дыхания - сделать искусственное дыхание и массаж сердца, кордиамин - 1 - 2 мл подкож.
3. Димедрол - 1 - 4 мл в/мыш.
4. Гидрокортизоновой мазью обработать глаза при их сильном поражении.
5. До прихода врача желательнее дать супрастин или тавегил.